



# Conoce sobre la eficacia de la Vacuna Universidad de Oxford y AstraZeneca

**2**  
Dosis

**Primera dosis día cero y segunda dosis 12 semanas después de la primera.**



## Eficacia

**90 - 100 % para casos graves y moderados de la enfermedad. 70.4 % para casos leves y muy leves,** que requieran atención ambulatoria o no requieran atención médica.

**No está comprobado** que impida la infección con el virus y el contagio a otras personas, por eso, aunque estés vacunado debes seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad para proteger a quienes aún no lo estén.

**Poblaciones excluidas de la vacunación**



Menores de 18 años.



Gestantes.

**Para tener en cuenta**



**No deben aplicarse la vacuna,** las personas con antecedentes conocidos de alergia o anafilaxia con alguno de sus componentes.

**Las personas inmunocomprometidas deben vacunarse con orientación y acompañamiento de su médico tratante.**

**Las mujeres lactantes pueden ser vacunadas en la etapa que les corresponda sin que su condición sea una contraindicación.**

## Efectos secundarios

Los efectos esperados y que desaparecerán con el paso de los días después de la vacuna son:



- Dolor y sensibilidad en el sitio de la inyección.
- Dolor de cabeza.
- Fatiga.
- Dolor muscular.
- Malestar.
- Fiebre.
- Escalofríos.
- Dolor en las articulaciones.
- Náuseas.

Puedes consultar con tu médico la posibilidad de tomar medicamentos **que ayuden a aliviar los síntomas.**

Los efectos o reacciones graves son muy raros, **pero pueden ocurrir.**

Actualiza tus datos **CLIC AQUÍ** 

SI TE INFORMAS SOBRE LA VACUNACIÓN PARA COVID-19

