

Nulytely o Travad Pik

Última actualización: enero de 2025.



La duración del examen es de 40 minutos, aproximadamente. Generalmente se realiza con sedación. Sigue estas recomendaciones para tu examen:

La preparación intestinal adecuada es fundamental para un examen exitoso.

Travad Pik.

A Adquiere, con anticipación, el medicamento que te hayan prescrito:



B 7 días antes del examen, recuerda suspender estos medicamentos:

1 lbuprofen, celecoxib, naproxen, diclofenaco.



la mañana. No te apliques la insulina ni tomes el hipoglicemiante antes del estudio.

2 Si eres diabético infórmalo al pedir la cita para que

te la asignen en un espacio en las primeras horas de

1 4 sobres de Polietilenglicol (Nulytely) o 2 sobres de


Además, si estás tomando warfarina o estás anticoaquilado recuerda informarle a tu médico para ajustar el manejo.

3 Si debes tomar medicamentos el día del examen, pásalos con una pequeña cantidad de agua.

guayaba, maracuyá, entre otros), frutos secos, verduras,

café, tinto, leche, queso, quesito ni otro lácteo, arroz, avena, jugos o bebidas de color rojo u oscuro, fibras,

granola, productos integrales, batidos verdes.



1 No consumas los siguientes alimentos: carnes rojas, granos (lentejas, fríjoles, garbanzos, maíz, arveja, entre otros), frutas con semillas o cáscaras (granadilla, papaya,

Ingiere abundantes líquidos.



3 Evita bebidas alcohólicas, lácteos y sus derivados.



1 Continúa con la dieta blanda, baja en fibra.





1 Toma una dieta líquida durante todo el día. Puedes consumir: agua, aromáticas, agua de panela, jugos sin leche, gelatinas de colores claros, bebidas hidratantes

que no sean de color rojo ni morado.

pastas sin papa.





2 Te sugerimos estos alimentos para las comidas del día: Desayuno: galletas de soda, aromática o agua de panela. Almuerzo: puedes tomarte un caldo/consomé de pollo o carne, sin grasa y pasado por el colador o sopa de

• Comida: entre las 6:00 p. m. y 7:00 p. m. solo

o cualquiera de los líquidos mencionados.



te corresponda:

naranjada.

Revuelve y refrigera.

3 Con esta alimentación y el comienzo de la toma

Algo: gelatina de colores claros: naranja, limón o piña.

puedes tomar líquidos: consomé pasado por colador

deposiciones líquidas y claras. El día anterior al examen inicia la toma del medicamento que

A las 6:00 p. m.

Travad Pik

Diluye 1 sobre de Travad Pik en 150

mililitros, únicamente, de agua al

clima. Usa el vaso dosificador.

Mezcla bien por 3 minutos.


Travad Pik siguiendo la misma

Consume 1 vaso (250ml) solo de agua

cada 30 minutos hasta ajustar 5 vasos.

del medicamento se inicia la preparación de tu intestino para la colonoscopia. Esto te ocasionará





en el transcurso de 4 y 6 horas.

El último vaso debes tomarlo a más

tardar 4 horas antes del examen.

Recuerda que la preparación se toma

Polietilenglicol (Nulytely)

Entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m.

Diluye 4 sobres de Nulytely en 2 litros

de agua, agua saborizada sin gas o



preparación.

250 ml

líquidas y de color amarillo.

antes del procedimiento.

posterior al estudio realizado.

No consumas más líquidos ni sólidos 4 horas

3 Asiste con acompañante idóneo mayor de 18 años, quien debe permanecer durante el procedimiento y

Si no tienes restricción de líquidos puedes consumir más agua solo hasta 4 horas antes del examen. Recuerda que la hidratación es el éxito de la preparación. G ¿A qué debo estar atento?

1 Después de haber tomado todos los líquidos para la preparación, tus evacuaciones deben ser totalmente



Trae todos los documentos

Documento de identidad.

En caso de que no hayas cumplido con las anteriores indicaciones, tu examen será cancelado y deberemos reprogramarlo.

Si tu preparación es con Travad Pik, amplía información en este video

CLIC AQUÍ

Colonoscopias que te hayan realizado.

Orden médica.

iASISTE A

para el procedimiento.

Cuidados después del examen Si el procedimiento se realiza bajo sedación, no debes movilizarte en moto ni conducir ningún tipo de vehículo, o manipular maquinaria. Si no se realiza bajo sedación, puedes continuar con las actividades que haces en tu vida diaria como ir a trabajar, estudiar, ejercitarte o manejar. Una hora después del procedimiento puedes volver a alimentarte como lo haces normalmente. Si presentas sangrado o dolor de intensidad moderada a severa, consulta

Si presentas alguno de los siguientes antecedentes, infórmale a tu médico para que defina cuál es el nivel de atención adecuado para realizar este procedimiento.

 Discapacidad mental o trastorno psiquiátrico descompensado. Obesidad mórbida.

- Síndrome de Down.
- No olvides informarle si has presentado: Una crisis de asma en 8 días previos

a la cita.

Llega 30 minutos antes del examen


para hacer los trámites necesarios

 Un evento agudo cardiovascular (enfermedad cerebrovascular o infarto) o

SULCY

te han realizado una cirugía de pulmón en los 2 meses previos a la cita.

Gracias por seguir nuestras recomendaciones y contribuir para que tu estudio permita un correcto diagnóstico.







¡Ten en cuenta!

 Insuficiencia cardíaca descompensada. Uso de oxígeno domiciliario. EPOC, apnea del sueño, cáncer de pulmón.

sura.co/web/ayudas-diagnosticas