

Vacuna Janssen

de Johnson & Johnson para la reducción de síntomas del COVID-19



1
Dosis


Eficacia



85 - 100 % para casos graves y moderados de la enfermedad.



66.9 %, para casos leves y muy leves, que requieran atención ambulatoria o no requieran atención médica.



No está comprobado que impida la infección con el virus y el contagio a otras personas, por eso, aunque estés vacunado debes seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad para proteger a quienes aún no lo estén.

Poblaciones excluidas de la vacunación



Menores de 18 años.



Gestantes.

Ten en cuenta



No deben aplicarse la vacuna, las personas con antecedentes conocidos de alergia o anafilaxia a cualquier componente de la vacuna.



Las personas inmunocomprometidas deben vacunarse con orientación y acompañamiento de su médico tratante.

Las mujeres lactantes pueden ser vacunadas en la etapa que les corresponda sin que su condición sea una contraindicación.

Efectos secundarios

Los efectos esperados y que desaparecerán con el paso de los días después de la vacuna son:

- Dolor en el brazo donde se inyecta la vacuna.
- Náuseas.
- Dolor muscular.
- Fiebre.
- Dolor de cabeza.
- Fatiga.



Puedes consultar con tu médico la posibilidad de tomar medicamentos **que ayuden a aliviar los síntomas.**

Los efectos o reacciones graves son muy raros, **pero pueden ocurrir.**

Signos de alarma de posibles eventos trombóticos:



- Dificultad para respirar.
- Dolor en el pecho.
- Inflamación de las piernas.
- Dolor abdominal que persiste después de la vacunación.
- Síntomas neurológicos.
- Dolores de cabeza intensos o persistentes que empeoran.
- Visión borrosa que se produce varios días después de la vacunación.
- Hematomas (en cualquier lugar que no sea el lugar de la inyección).
- Puntos rojos en la piel, que aparecen unos días o más después de la vacunación.

Actualiza tus datos **CLIC AQUÍ**



SI TE INFORMAS SOBRE LA VACUNACIÓN PARA COVID-19

