

AL DÍA CON LA VIDA, AL DÍA CON LAS VACUNAS.



¡EN NUESTRAS IPS
TODOS LOS DÍAS SON
DE VACUNACIÓN!

Vacúnate y vacuna a tus hijos.

¡Encuentra la IPS más cercana **AQUÍ!**



¡SIN COSTO! HAZLO DE UNA.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

EDAD	VACUNA	DOSIS	ENFERMEDAD QUE PREVIENE
Recién Nacido	Antituberculosis (BCG)	Única	Meningitis tuberculosa
	Hepatitis B	Recién nacido	Hepatitis B
A LOS 2 MESES	Difteria, B. Pertussis, tétanos (DTP)- Pentavalente	Primera	Difteria, tos ferina, tétanos
	Haemophilus influenza tipo B (Pentavalente)		Meningitis y otras enfermedades causadas por haemophilus influenza tipo B
	Hepatitis B (Pentavalente)		Hepatitis B
	Vacuna inactivada de Polio (VIP)		Poliomielitis
	Rotavirus		Gastroenteritis (diarrea) por rotavirus
	Neumococo conjugada		Neumonía, otitis y meningitis
A LOS 4 MESES	Difteria, B. Pertussis, tétanos (DTP)- Pentavalente	Segunda	Difteria, tos ferina, tétanos
	Haemophilus influenza tipo B (Pentavalente)		Meningitis y otras enfermedades causadas por haemophilus influenzae tipo B
	Hepatitis B (Pentavalente)		Hepatitis B
	Vacuna inactivada de polio (VIP)		Poliomielitis
	Rotavirus		Gastroenteritis (diarrea) por rotavirus
	Neumococo conjugada		Neumonía, otitis y meningitis
EDAD LOS 6 MESES	Difteria, B. Pertussis, tétanos (DTP)- Pentavalente	Tercera	Difteria, Tos ferina, Tétanos
	Haemophilus influenza tipo B (Pentavalente)		Meningitis y otras enfermedades causadas por haemophilus influenza tipo B"
	Hepatitis B (Pentavalente)		Hepatitis B
	Vacuna inactivada de polio (VIP)		Poliomielitis
	Influenza estacional	Primera	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza
A LOS 7 MESES	Influenza estacional	Segunda	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza
A LOS 12 MESES	Sarampión, rubéola y paperas (SRP o triple viral)	Dosis 1	Sarampión, rubéola y paperas
	Neumococo conjugada	Refuerzo	Neumonía, otitis y meningitis
	Hepatitis A	Única	Hepatitis A
	Varicela	Dosis 1	Varicela
	Influenza estacional	Anual	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza
A LOS 18 MESES	Difteria B. Pertussis, tétanos (DTP) Pentavalente	Primer refuerzo	Difteria, tos ferina, tétanos
	Haemophilus influenza tipo B (Pentavalente)		Meningitis y otras enfermedades causadas por haemophilus influenza tipo B
	Hepatitis B (Pentavalente)		Hepatitis B
	Vacuna inactivada de polio (VIP)	Primer refuerzo	Poliomielitis
	Fiebre amarilla (FA)	Única	Fiebre amarilla
	Sarampión, rubéola y paperas (SRP o triple viral)	Refuerzo	Sarampión, rubéola y paperas
A LOS 5 AÑOS	Difteria, B. Pertussis, tétanos (DTP)	Segundo refuerzo	Difteria, tos ferina y tétanos
	Vacuna inactivada de polio (VIP)	Segundo refuerzo	Poliomielitis
	Varicela	Refuerzo	Varicela
Niñas de 9-17 años.	Virus Papiloma Humano (VPH)	Única	Cáncer cervical
Niños de 9 años	Virus Papiloma Humano (VPH)	Única	Cáncer anal; verrugas genitales (condiloma acuminado)
Mujeres Gestantes a partir de la semana 14	Influenza estacional	Una dosis a partir de la semana 14 de gestación	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza
Mujeres gestantes a partir de la semana 26	Tétanos, difteria reducida, B. pertussis acelular (Tdap)	Dosis única a partir de la semana 26 de gestación en cada embarazo (en zonas de riesgo para tétanos y difteria desde la semana 21 de gestación)	Tétanos neonatal - difteria - tosferina al recién nacido
Mujeres en edad fértil (MEF) entre los 10 y 49 años	Toxoide tetánico y diftérico, uso en adulto (Td)	MEF: 5 dosis Td1: dosis inicial Td2: al mes de Td1 Td3: a los 6 meses de Td2 Td4: al año de Td3 Td5: al año de la Td4 Refuerzo cada 10 años (15, 25, 35, 45)	Difteria, tétanos materno y tétanos neonatal
Población adulta en zonas endémica	Fiebre amarilla (FA)	Única para toda la vida	Fiebre amarilla
Adultos de 60 años en adelante	Influenza estacional	Una dosis anual	Enfermedad respiratoria causada por el virus de la influenza

Nota: Aplicar una dosis de refuerzo de influenza estacional entre 12 y 23 meses de edad.

Se evitan entre 2 y 3 millones de muertes

¿Sabías que cada año, gracias a las vacunas, se evitan entre 2 y 3 millones de muertes? Además, si todos los niños fueran vacunados se podrían salvar 1.5 millones de vidas más. Imagina todos los partidos del Mundial de Fútbol de Rusia en los asientos llenos de niños, esa es la cifra aproximada de vidas que anualmente salvan las vacunas.

Protege a tu familia de más de 11 enfermedades

Estar al día con las vacunas te puede ayudar a proteger a tu familia de más de 11 enfermedades graves como son: polio, sarampión, tos ferina, rubeola, hepatitis B, difteria, tétanos, parotiditis, meningitis, tuberculosis y neumococo. Además de las vacunas para las mujeres gestantes y en edad fértil, es decir, entre los 10 y los 49 años.

Consúltalo con tu médico de familia

Circulan en las redes sociales mensajes en contra de las vacunas. La experiencia del retroceso de enfermedades en Europa por la aparición de grupos antivacunas nos debe servir de experiencia. Si tienes dudas frente a una vacuna, consúltala a tu médico de familia, quien tiene todo el conocimiento para entregarte una respuesta acertada.

ESQUEMA COVID-19

Edad recomendada de aplicación	Primera dosis	Segunda dosis	Dosis adicional
6 meses a 2 años	X	X	No aplica
3 años a 5 años	X	X	No aplica
6 años a 12 años	X	X	No aplica
12 años a 17 años	X	X	6 meses de la última dosis
Mayores de 18 años	X	X	6 meses de la última dosis*

*Solo para las poblaciones definidas por el ministerio.

*El inicio del esquema de covid, así como la dosis adicional se aplicarán con las vacunas definidas por el ministerio para cada grupo de edad y según disponibilidad de los biológicos en las IPS entregados por el Ministerio de Salud.

Grupos priorizados para dosis adicional

Gestantes	Cuando hayan pasado 6 meses de su esquema de vacunación (esquema primario o refuerzos). Se debe garantizar una dosis por cada embarazo.
Mayores de 60 años	La dosis adicional se debe administrar después de que hayan pasado al menos 6 meses de su esquema de vacunación (esquema primario o refuerzos).
**Mayores de 18 años con comorbilidades	La población con comorbilidades debe recibir una dosis adicional al menos 6 meses luego de su última dosis.
Talento Humano de Salud	La dosis adicional se debe administrar después que hayan pasado al menos 6 meses de su esquema de vacunación (esquema primario o refuerzos).

** obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, EPOC, falla cardíaca, hipertensión arterial, hipotiroidismo, enfermedades reumáticas o hematológicas, Cáncer activo en tratamiento, patologías hematológicas, pacientes con enfermedad oncológica que terminaron tratamiento (<6 meses), trasplantados o en lista de espera, VIH, tuberculosis latente, activa o fibrotorax, pacientes en tratamiento con esteroides en altas dosis, Inmunosuprimidos, esclerosis múltiple y neuromielitis óptica, antecedentes de síndrome de Guillain Barré o parálisis facial, anticoagulados.

Líneas de atención 01 8000 519 519

Bogotá 601 4897941

Cali 602 3808941

Medellín 604 4486115