



Androstenediona pre y pos ACTH para niños

PREPARACIÓN

Sigue estas recomendaciones para tu examen:




Tres (3) semanas antes de la prueba, **el niño debe mantener la dieta recomendada por el médico.**



Entre seis (6) y ocho (8) horas antes de realizarle la prueba debe **guardar ayuno.** No puede comer alimentos ni beber líquidos.



No debe realizar ejercicio antes de la prueba.




Consulta con el médico si el niño **debe suspender el tratamiento hormonal** el día de la prueba.



Debe asistir al laboratorio con un acompañante mayor de 18 años y que no esté en situación de discapacidad.



En ocasiones puede ser un poco difícil canalizar la vena del niño y deberá intentarse varias veces. Intenta conservar la calma para ayudar al niño a estar tranquilo.



En el proceso de canalizar una vena se puede producir sangrado, acumulación de sangre debajo de la piel (hematoma), mareo y raramente, infección.



El niño y su acompañante **deben seguir las indicaciones de nuestro personal de salud.**



El niño no debe comer alimentos ni tomar bebidas durante la prueba.



Recuerda darle al personal del laboratorio los datos del niño: edad, peso, medicamentos que toma, dosis de los mismos, motivo de realización del examen, si tiene diagnóstico de diabetes o hipoglicemia.



Pregúntale a nuestro personal de salud los cuidados que debes tener con el niño durante el examen.

Recuerda



Tanto el niño como su acompañante, **deben contar con disponibilidad para permanecer en el laboratorio** durante todo el tiempo de la prueba. Te recomendamos llevar libros, juguetes u otras actividades que te permitan pasar el tiempo.



El cumplimiento de estos horarios es de suma importancia para la adecuada realización de la prueba.

Trae todos los documentos



• Documento de identidad



• Orden médica



¡ASISTE A TIEMPO!

Llega 15 minutos antes del examen

Este espacio será necesario para hacer el registro de tu información, confirmar la correcta preparación y que apruebes la realización de tu examen.

Cuidados después del examen

- ✓ Cuando se retira el catéter pueden formarse hematomas en la piel que generalmente desaparecen sin ninguna complicación.
- ✓ El niño puede sentir picazón e irritación en el lugar donde fue canalizado.
- ✓ El niño puede presentar, durante 12 horas después de la prueba, baja de presión en la sangre, debilidad en los músculos, mareos, náuseas, sofoco, vómito, irritabilidad y sueño.
- ✓ El niño no debe acercarse a balcones o ventanales ya que, debido a la sensación de sueño se pueden producir caídas.
- ✓ En caso de que el niño presente complicaciones debes llevarlo al servicio de urgencias.
- ✓ Si tienes alguna duda, consulta con nuestro personal de salud.

Gracias por seguir nuestras recomendaciones y contribuir para que tu estudio permita un correcto diagnóstico.

