

Cortisol pre y post dexametasona para bebés

PREPARACIÓN



Sigue estas **recomendaciones** para tu examen:



Entre cuatro (4) y seis (6) horas antes de la prueba, el bebé debe guardar ayuno. No debe comer alimentos ni tomar bebidas.



Algunos fármacos pueden cambiar los resultados de esta prueba. Es posible que te pidan que el bebé deje de tomar algunos medicamentos por un período de 24 a 48 horas antes de que se tome la muestra de sangre. Estos medicamentos incluyen aspirina, morfina, metadona, litio, inhibidores de la monoaminooxidasa (MAOI) y diuréticos. Sigue las indicaciones del médico del bebé.



Debe venir acompañado de un adulto responsable, mayor de 18 años.

Para este examen se realizan dos tomas de muestras en sangre, en dos días consecutivos:

DÍA 1



Día 1. El bebé y su acompañante deben estar en el laboratorio entre las 8:00 a. m. y 9:00 a. m. Allí le tomaremos una muestra de sangre para realizar en el laboratorio la prueba cortisol antes de tomar la dexametasona (pre estimulación). Ese mismo día, el bebé debe tomarse, a las 11:00 p. m. la pastilla de dexametasona de 1 mg. Puede hacerlo con leche para prevenir malestar o acidez estomacal.

DÍA 2



El bebé y su acompañante deben estar en el laboratorio entre las 8:00 a. m. y 9:00 a. m. Allí le tomaremos una muestra de sangre para realizar en el laboratorio la prueba de cortisol post estimulación.



El bebé y su acompañante **deben seguir las indicaciones de nuestro personal de salud.**



El bebé no debe comer alimentos ni tomar bebidas durante la prueba.



Pregúntale a nuestro personal de salud los cuidados que debes tener con el bebé durante el examen.

Trae todos los documentos



• Documento de identidad



• Orden médica



¡ASISTE A TIEMPO!

Llega 15 minutos antes del examen

Este espacio será necesario para hacer el registro de tu información, confirmar la correcta preparación y que apruebes la realización de tu examen.

Cuidados después del examen

- El bebé y su acompañante deben seguir las indicaciones de nuestro personal de salud.
- El bebé no debe comer alimentos ni tomar bebidas durante la prueba.
- Pregúntale a nuestro personal de salud otros cuidados que debes tener con el bebé durante el examen.

Gracias por seguir nuestras recomendaciones y contribuir para que tu estudio permita un correcto diagnóstico

