




Crecimiento hormona (GH) pre y post L-DOPA para niños PREPARACIÓN

Sigue estas recomendaciones para tu examen:



Si el niño sufre de enfermedad respiratoria y está en tratamiento con medicamentos que dilaten sus bronquios, verifica con su médico la viabilidad de esta prueba ya que está contraindicada.



Si el niño sufre de enfermedades del corazón o de presión baja en la sangre (hipotensión), consulta con su médico la viabilidad de realizarte esta prueba pues podría estar contraindicada.



El niño no debe tener fiebre, vómito, gripa, diarrea o algún proceso infeccioso. En caso de que presente alguno de estos síntomas debes reprogramar su cita.



Mínimo seis (6) horas antes de la prueba, **el niño debe guardar ayuno.** No debe comer alimentos ni tomar líquidos.



El niño no debe realizar actividad física 30 minutos antes de la prueba ni después de la misma.



El niño debe estar acompañado de un adulto responsable mayor de 18 años y que no esté en situación de discapacidad.



Debes seguir las indicaciones de nuestro personal de salud.



Tanto el niño como su acompañante deben contar con disponibilidad para permanecer en el laboratorio durante el tiempo que dura la prueba, dos horas. Te recomendamos llevar libros, juguetes u otras actividades.

Trae todos los documentos



• Documento de identidad



• Orden médica



• Si el niño sufre de enfermedades respiratorias, cardiovasculares o de los riñones, debes llevar la autorización por escrito de su médico especialista tratante para realizarte esta prueba.



¡ASISTE A TIEMPO!

Llega 15 minutos antes del examen

Este espacio será necesario para hacer el registro de tu información, confirmar la correcta preparación y que apruebes la realización de tu examen.

Cuidados después del examen

- ✓ Cuando se retira el catéter pueden formarse hematomas en la piel que generalmente desaparecen sin ninguna complicación.
- ✓ El niño estará en control por lo menos 30 minutos después de realizarle la prueba para estar atentos a cualquier variación en su estado de salud.
- ✓ El niño no debe ser transportado en motocicleta.
- ✓ El niño puede presentar, durante las 12 horas posteriores a la prueba, baja de presión en la sangre, debilidad en los músculos, dolor de cabeza, mareos, taquicardia, irritabilidad y mucho sueño.
- ✓ El niño debe evitar realizar ejercicio físico después de la prueba como trotar, caminar largas distancias, montar en bicicleta, nadar, entre otras actividades.
- ✓ El niño no debe acercarse a balcones o ventanales ya que, debido a la sensación de sueño se pueden producir caídas.
- ✓ En caso de que el niño presente complicaciones debes llevarlo al servicio de urgencias.
- ✓ Si tienes alguna duda consulta con nuestro personal de salud.

Gracias por seguir nuestras recomendaciones y contribuir para que tu estudio permita un correcto diagnóstico.

