

Crecimiento hormona (GH) pre y post L-DOPA para adultos

PREPARACIÓN



Sigue estas recomendaciones para tu examen:



Si sufres de enfermedad respiratoria y estás en tratamiento con medicamentos que dilaten tus bronquios, verifica con tu médico la viabilidad de esta prueba ya que está contraindicada.



Si sufres de enfermedades del corazón o de presión baja en la sangre (hipotensión), consulta con tu médico la viabilidad de realizarte esta prueba pues podría estar contraindicada.



No debes tener fiebre, vómito, gripa o diarrea, diarrea o algún proceso infeccioso. En caso de presentar alguno de estos síntomas, debes reprogramar tu cita.



Entre ocho y diez horas antes de la prueba, **debes guardar ayuno.** No debes comer alimentos ni tomar líquidos.



No debes realizar actividad física 30 minutos antes de la prueba ni después de la misma.



Debes asistir acompañado de un adulto responsable mayor de 18 años y que no esté en situación de discapacidad.



Debes seguir las indicaciones de nuestro personal de salud.



Tanto tú como tu acompañante deben contar con disponibilidad para permanecer en el laboratorio durante el tiempo que dura la prueba, dos horas. Te recomendamos llevar libros u otras actividades.

Trae todos los documentos



• Documento de identidad



• Orden médica



• Si sufres de enfermedades respiratorias, cardiovasculares o de los riñones, debes llevar la autorización por escrito de tu médico especialista tratante para realizarte esta prueba.



**¡ASISTE
A TIEMPO!**

Llega 15 minutos antes del examen

Este espacio será necesario para hacer el registro de tu información, confirmar la correcta preparación y que apruebes la realización de tu examen.

Cuidados después del examen

- ✓ Cuando se retira el catéter pueden formarse hematomas en la piel que generalmente desaparecen sin ninguna complicación.
- ✓ Estarás en control por lo menos 30 minutos después de realizarle la prueba para estar atentos a cualquier variación en tu estado de salud.
- ✓ No debes transportarte en motocicleta.
- ✓ Puedes presentar, durante las 12 horas posteriores a la prueba, baja de presión en la sangre, debilidad en los músculos, dolor de cabeza, mareos, taquicardia, irritabilidad y mucho sueño.
- ✓ Debes evitar realizar ejercicio físico después de la prueba como trotar, caminar largas distancias, montar en bicicleta, nadar, entre otras actividades.
- ✓ No debes acercarte a balcones o ventanales ya que, debido a la sensación de sueño se pueden producir caídas.
- ✓ En caso de que se presenten complicaciones debes acudir al servicio de urgencias.
- ✓ Si tienes alguna duda consulta con nuestro personal de salud.

Gracias por seguir nuestras recomendaciones y contribuir para que tu estudio permita un correcto diagnóstico.

